


# Auskultation von Herztönen

*Das Ziel der oben genannten Maßnahme ist, eine Veränderung der Herztöne über mehrere Auskultationen hinweg festzustellen. Werden die Herztöne bei möglicher Verletzung des Herzens zunehmend leiser, ist dies als Hinweis auf eine Perikardtamponade zu werten. Dieser Verdacht hat zunächst keine direkte therapeutische Auswirkung. Das aufnehmende Schockraumteam wird für diesen Hinweis jedoch dankbar sein. Der Verdacht der Perikardtamponade kann durch die Feststellung weiterer Zeichen und Symptome erhärtet werden. Leiser werdende Herztöne sind somit nur ein Hinweis auf eine Perikardtamponade.*



1. Die Herztöne werden im 4. ICR links parasternal auskultiert. Der 4. ICR kann leicht über den Louiswinkel gefunden werden. Ist dieser getastet, befindet sich links davon die 2. Rippe. Darunter ist der 2. ICR zu tasten.

Um eine Veränderung der Lautstärke beurteilen zu können, müssen die Herztöne jeweils am selben Ort auskultiert werden.

Der Auskultationsort ist hier rot markiert.

Stand:  
05.07

Erstellt von:  
Kühl

Freigegeben durch:  
Walter